

دراسة نسيجية للسقف البصري Optic tectum في أفعى الماء العراقية *natrix tessellata tessellata*

نهلة عبد الرضا البكري*

أزهار رحيم حسين*

تاريخ قبول النشر 2010/ 3/ 1

الخلاصة

يملك السقف Tectum للدماغ المتوسط Mesencephalon زوجا من الفصوص البصرية optic lobes البارزة ويعد مركزا انعكاسيا بصريا optic center reflex تستلم اليافا من شبكية العين eye retina.

يتألف السقف البصري optic tectum نسيجيا في أفعى الماء العراقية *natrix tessellata tessellata* من سبع طبقات رئيسة فقط مرتبة من الداخل إلى الخارج وكما يأتي : الطبقة النطاقيّة The Stratum Zonula (SZ) ، الطبقة البصرية The Stratum Opticum (SO) ، الطبقة الليفية السنجابية السطحية The Stratum Fibrosum et Griseum Superficialis (SFGS) ، الطبقة السنجابية المركزية The Stratum Album Central (SAC) ، الطبقة السنجابية حول البطينية Central (SAC) ، الطبقة السنجابية حول البطينية The Stratum Album Periventricular (SAP) ، الطبقة الاليومية حول البطينية The Stratum Album Periventricular (SAP) .

وتمثل الطبقات الثلاث الأخيرة الطبقات العميقة Deep layers للسقف البصري لأفعى الماء العراقية . وتعد الطبقة الأولى وهي الطبقة النطاقيّة (SZ) انحف طبقات السقف إذ بلغ سمكها (20-25) مايكروملي ميتر وتمثل طبقة سطحية . أما الطبقة الأكثر سمكا فهي الطبقة الثالثة وهي الطبقة الليفية السنجابية السطحية (SFGS) إذ بلغ سمكها (150-180) مايكروملي ليتر وتتكون هذه الطبقة من ثلاث طبقات ثانوية هي (a,b,c) .

تدخل الألياف البصرية optic fibers القادمة من شبكية العين عن طريق الطبقة الثانية وهي الطبقة البصرية (SO) في حين تخرج هذه الألياف من السقف عن طريق الطبقة السادسة وهي الطبقة السنجابية حول البطينية (SGP) . وتتركز الخلايا في الطبقة الرابعة وهي الطبقة السنجابية المركزية (SGC) إذ تظم ثلاثة أنواع من الخلايا هي A - خلايا عصبية متوسطة الحجم كثيرة الشكل B ، medium pear shape neuron ، خلايا عصبية متوسطة الحجم مغزلية الشكل C ، medium fusiform neuron - خلايا عصبية متوسطة الحجم متعددة الأقطاب medium multipolar neuron .

الكلمات المفتاحية: السقف البصري ، أفعى الماء

المقدمة:

النظام البصري كما أنها تمتلك عيون أثرية غير متطورة مقارنة مع الأسماك الاعتيادية [4] . وفي البرمائيات يتكون السقف البصري من تسع طبقات خلوية وظيفية Cellular and plexiform layers . وفي الزواحف ذكر [7] أن السقف البصري للعضاء *Iguna iguna* يكون عالي التمايز ومؤلف على الأقل من اربعة عشر من الصفائح المرتبة شعاعيا . ويلعب السقف البصري في الطيور دور المفتاح في سير المعلومات البصرية لكونه يستلم اعداد كبيرة من مسالك الشبكية الصادرة Retinal afferents [8] . وانه يتكون من ست طبقات رئيسة فقط [9] ، [10] ، [11] . وفي اللبائن تكون الفصوص البصرية مضمحلة وتتحول إلى الاكيمات العليا Superior colliculus [12] . وقسم [13] الاكيمات العليا

أفعى الماء العراقية احد أنواع الأفاعي غير السامة الموجودة في جميع مناطق العراق وهي تتغذى على الأسماك والضفادع الصغير وتمتلك عيون صغيرة ويوجد في جهتها الظهرية حرشفتين ذي شكل يشبه \wedge غامقة اللون [1] . حظيت دراسة الجهاز العصبي باهتمام كبير من قبل الباحثين ومن ضمنها دراسة سقف الدماغ المتوسط (السقف البصري Optic tectum) لكونه المسئول عن استلام السيالات العصبية الواردة Afferent nerve impulse القادمة من شبكية العين . فقد درس في جميع أنواع الفقريات وباستخدام تقنيات مختلفة . فقد أشار كلا من [2] و [3] إلى أن السقف البصري في الأسماك يتألف من ست طبقات رئيسة فقط . ولا تمتلك سمكة الكهف العمياء *Astyanax hubbsi* أي استجابة لدور

جهته الأمامية ومتضيقا ويتصل بالحبل الشوكي Spinal cord من جهته الخلفية شكل (1) .

الموصف النسجي للسقف البصري في دماغ أفعى الماء The histological description of the optic tectum in the water snake brain

بلغ السمك الكلي للسقف البصري 595-630 μm وهو يتكون من سبع طبقات رئيسية وثلاث طبقات ثانوية تابعة للطبقة الرئيسية الثالثة وهي كالاتي ابتداء من الأم الحنون Pia mater في الخارج ووصولاً إلى البطين البصري Optic ventricle شكل (2) :-

1- الطبقة النطاقية The Stratum Zonula(SZ)

وهي الطبقة الرئيسية الأولى وتكون سطحية الموقع ظفيرية الشكل plexiform layer رقيقة جداً تكون منطقة ضيقة يبلغ سمكها 20-25 μm يوجد في هذه الطبقة عدد قليل جداً من خلايا عصبية كروية الشكل صغيرة الحجم Small spherical neurons يبلغ قطرها 4-6 μm شكل (2) ، (3) .

2- الطبقة البصرية

The Stratum Opticum(SO)

وهي الطبقة الرئيسية الثانية (طبقة مسلك الألياف البصرية Optic tract fibers) يبلغ سمكها 30-40 μm تدخل الألياف البصرية هذه الطبقة من المنطقة الخظمية البطينية Rostro ventricle للفص البصري ثم تنفصل وتتوزع على جانبي الفص حتى تصل إلى الجزء الأذني Cuadal part منه . توجد في هذه الطبقة ما يشبه الفسح Gaps متكونة من حزميات مفردة تنفصل عن بعضها بمناطق تكون خلاياها قليلة ومبعثرة . تمتلك هذه الطبقة عدداً قليلاً من الخلايا العصبية الكروية الشكل والصغيرة الحجم يبلغ قطرها 5 μm وتمتلك أيضاً خلايا عصبية مغزلية الشكل Fusiform neuron يبلغ قطرها 10-15 μm إضافة إلى بعض الخلايا الدبقية Glial cells التي تتخلل الألياف العصبية شكل (2) ، (3) .

3- الطبقة الليفية السنجابية السطحية The Stratum Fibrosum et Griseum Superficials(SFGS)

وهي الطبقة الرئيسية الثالثة وتكون اسمك الطبقات 150-180 مايكرومليتر وتقسّم إلى ثلاث طبقات ثانوية هي (a ، b ، c) شكل (4) ، (5) .

الطبقة الثانوية a سمكها 60-70 مايكرومليتر وتمتلك عدداً قليلاً من خلايا عصبية مبعثرة تكون كروية

للزباية الشجرية Shrew tree إلى خمس طبقات فقط وفي السنجاب تتكون من سبع طبقات فقط . صممت الدراسة الحالية للتعرف على سقف الدماغ المتوسط في أفعى الماء العراقية والتعرف على عدد طبقاته والتركيب النسجي لكل طبقة من الطبقات . وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها في مجال الدراسات النسجية والتشريحية للأفاعى في العراق.

المواد وطرائق العمل :

أجريت الدراسة على 15 أفعى نوع أفعى ماء *atrix tessellata tessellate* قتلت وشرحت واستخرج الدماغ الذي أجريت عليه خطوات تحضير المقاطع النسجية اعتماداً على [14] ولونت الشرائح بملون Cresyl Fast Violet Stain لتوضيح التركيب الخلوي لطبقات السقف البصري ويسمى أيضاً بملون نسل Nissl stain [15] كما استخدم ملون Bieschowskys Stain والذي يسمى بملون نترات الفضة لتوضيح المحاور الاسطوانية وتغصنات الخلايا العصبية، أما ملون أزرق المثلين Methylen Blue Stain فاستخدم لتوضيح الخلايا النجمية بشكل جيد . ثم التقطت الصور الفوتوغرافية للمقاطع النسجية المنتخبة لتوضيح نتائج الدراسة الحالية . كما وأخذت القياسات باستخدام المجهر المركب [16] .

النتائج :

The morphological description of the brain in the water snake

ظهر دماغ أفعى الماء ضيقاً ومتطاولاً إذ يبلغ طوله 18 ملليمتر ويتألف من ثلاثة أقسام رئيسية هي دماغ أمامي ووسطي وخلفي ويتكون الدماغ الأمامي من مقدم الدماغ وسرير الدماغ Diencphalon ، يكون مقدم الدماغ نصف كرة المخ Cerebral hemisphere اللذان يكونا بشكل حوصلتين جانبيتين يعلوهما الفصان الشميان Olfactory lobes الذي يتصل كل منهما بالساق الشمية Olfactory peduncle تتوسع جهته البعيدة مكونة بصلة شمية Olfactory bulb . ويمثل الدماغ البيئي منطقة صغيرة تقع بين نصفي كرة المخ . أما الدماغ المتوسط فأن جزؤه الظهري يمثل السقف البصري ويكون ذو فصان بصريان Optic lobes يطلق عليها الأجسام الثنائية Corpora bigemina ويقسمها أحود مستعرض مكون الأجسام الرباعية quadrigemina يتألف الدماغ الخلفي من المخ Cerebellum ومن النخاع المستطيل Medulla oblongata الذي يكون عريضاً من


الخلية . ويظهر ملون نترات الفضة ترتيب التغصنات بصورة ظفائرية أذ تنزل إلى الجزء العلوي من الطبقة التي تليها شكل(4)،(6) .

6- الطبقة السنجابية حول البطينية The Stratum Griseum Periventricular(SGP)

سمكها 60-70 مايكرومليتر وهي منطقة ضيقة نسبياً تحتوي عدداً من الألياف العصبية إذ تمثل الطبقة الرئيسة للألياف الواردة Efferents fibers. كما تكون ذات كثافة معتدلة من الألياف العصبية وأنواعها عصبية كروية صغيرة قطرها 4-6 مايكرومليتر ، خلايا مغزلية ، خلايا متعددة الأقطاب كروية ذات حجم متوسط ، وخلايا كبيرة متعددة الأقطاب قطرها 15-30 μm الفروع المحورية والتغصنية تحتل مساحة واسعة تمتد إلى الطبقات الأعلى شكل (4)،(7) .

7- الطبقة السنجابية حول البطينية The Stratum Album Periventricular(SAP)

سمكها 40-50 مايكرومليتر وتمثل منطقة متميزة قليلة الخلايا ، ولا تظهر بشكل طبقة ليفية وإنما بشكل لبد عصبي Neuropil . تكون خلاياها صغيرة الحجم قطرها 4-6 مايكرومليتر ويوجد ضمنها خلايا دبقية Glia cell صغيرة الحجم. وتتجاور هذه الطبقة من الجهة البطينية مع طبقة البطانة الداخلية Ependymal layer التي تكون بشكل شريط ضيق مكون من صفين إلى ثلاثة صفوف من خلايا صغيرة كثرة ومغزلية وكروية الشكل . وان الطبقات الثلاثة الأخيرة تمثل الطبقات العميقة للسقف البصري لأفعى الماء العراقية شكل(2) ،(8) .



شكل (1) منظر ظهري لدماع أفعى الماء يوضح أجزاء الدماغ

c مخيخ ، ch نصفي كرة المخ ، d دماغ بيني ، mo نخاع مستطيل ، ob بصلة شميه ، ol فص شمي ، op ساق شمي ، opt فص بصري ، sc الحبل الشوكي .

وكثيرة الشكل Pear-shaped neuron كما توجد خلايا دبقية صغيرة . الفروع المحورية والتغصنية قد تصعد إلى الطبقات السطحية (SO) و(SZ) أو تنزل إلى الطبقات العميقة للسقف كما يتضح فيها أيضاً التزود الدموي Blood supply .

الطبقة الثانوية b

سمكها 20-30 مايكرومليتر وتشكل حزمة ضيقة من خلايا عصبية متوسطة الحجم مرتبة بشكل صف واحد تقع في مركز الطبقة ومن خلال هذه الصفة يمكن تمييز الطبقة الثانوية b عن الطبقتين الثانويتين a و b ، اجساد خلايا هذه الطبقة تكون كروية الشكل وقسم منها كمثرية الشكل كما تظهر في جسد الخلية العصبية انتفاخات صغيرة Small swellings في بعض جوانبها .

الطبقة الثانوية c

سمكها مماثل لسمك الطبقة الثانوية a . وتمتلك عدداً قليلاً من خلايا عصبية كروية وكثيرة الشكل . ويظهر في أجسادها تجمعات لحبيبات نسل (Nissl granules) .


4- الطبقة السنجابية المركزية The Stratum Griseum Central(SGC)

سمكها 100-130 مايكرومليتر وتسمى طبقة الرمادية المركزية Gray central layer وهي طبقة عريضة تعد منطقة خلوية لكثرة الخلايا فيها والتي تكون على ثلاثة أنواع هي: A- خلايا عصبية متوسطة الحجم كمثرية الشكل قطرها 8-12 مايكرومليتر سايتوبلازمها غزير يحيط بالنواة يبرز منه بداية تفرع تغصني بارز. B- خلايا عصبية متوسطة الحجم مغزلية الشكل قطرها 12-15 مايكرومليتر تكون بروزات علوية وسفلية تمتد عمودياً . وتكون هذه الخلايا مبعثرة على طول الطبقة. C- خلايا عصبية متوسطة الحجم متعددة الأقطاب قطرها 10-15 مايكرومليتر توجد في الثلث السفلي من هذه الطبقة تمتلك أجساد خلايا كروية أو مثلثة Spherical or triangular somata . كما تمتلك خلايا دبقية صغيرة الحجم . يمتد من جسد الخلية تغصنات Dendrites تنتفرع إلى تغصنات ثانوية تكون بعيدة عن جسد الخلية شكل (4) ،(6) .

5- الطبقة الالبومية المركزية The Stratum Album Central(SAC)


سمكها 80-100 مايكرومليتر وتسمى أيضاً بالطبقة البيضاء المركزية White central layer تمتلك خلايا صغيرة الحجم نسبياً قطرها 4-6 مايكرومليتر كما يمكن ملاحظة خلايا متوسطة الحجم متعددة الأقطاب قطرها 10-15 مايكرومليتر تقع في مركز الطبقة تكون أجسادها كروية أو مثلثة أو مغزلية الشكل . يمتد المحوار من جسد الخلية أو من التغصنات القريبة من جسد

sfgsc الطبقة الليفية السنجابية السطحية الثانوية c ، sgc
الطبقة السنجابية المركزية ، sgp الطبقة السنجابية حول
البطينية ، so الطبقة البصرية ، sz الطبقة النطاقية




شكل (5) مقطع مستعرض مار خلال الطبقة الليفية
السنجابية السطحية للفص البصري لدماع أفعى يوضح
خلايا الطبقة الثانوية b و c لاحظ حبيبات نسل . ملون
بنترات الفضة ، 1000 X .

ax محوار ، bv وعاء دموي ، ng حبيبات نسل ، sfgsb
الطبقة الليفية السنجابية السطحية الثانوية b ، sfgsc
الطبقة الليفية السنجابية السطحية الثانوية c ، sgc
الطبقة السنجابية المركزية ، td تغصنات سمكية .




شكل (2) مقطع مستعرض مار خلال الفص البصري لدماع
أفعى الماء يوضح جميع طبقات السقف البصري . ملون
أزرق مثلين X 40 .

ep بطانة عصبية ، opv بطين بصري ، pm الأم الحنون
، sac الطبقة الألبومية المركزية ، sap الطبقة الألبومية
حول البطينية ، sfgsa الطبقة الليفية السنجابية السطحية
الثانوية a ، sfgsb الطبقة الليفية السنجابية السطحية
الثانوية b ، sfgsc الطبقة الليفية السنجابية السطحية
الثانوية c ، sgc الطبقة السنجابية المركزية ، sgp
السنجابية حول البطينية ، so الطبقة البصرية ، sz
النطاقية




شكل (6) أشكال مختلفة لخلايا الطبقة السنجابية المركزية
sgc للفص البصري لدماع أفعى الماء . ملون الكريسيل
فايوليت X 1000 .

fn خلية عصبية مغزلية ، gc خلية دقيقة ، mn
خلية عصبية متعددة الأقطاب ، ng حبيبات نسل ، pin
خلية عصبية كثرية




شكل (3) الطبقتين الأولى sz والثانية so فقط من السقف
البصري لدماع أفعى الماء . الأسهم تشير إلى اتصال
الفسحة بالطبقة النطاقية . ملون بنترات الفضة ، X 1000 .
g فسحة ، pb حزميات كثيفة ، pm الأم الحنون ، so
الطبقة البصرية ، sz الطبقة النطاقية ، tf الحزميات
الخفيفة .



شكل (7) التغصنات الظفانيرية pd للطبقة الألبومية
المركزية sac للفص البصري لدماع أفعى الماء . ملون
بنترات الفضة ، X 400 .

sac الطبقة الألبومية المركزية sgp الطبقة السنجابية
حول البطينية




شكل (4) مقطع مستعرض مار خلال الفص البصري لدماع
أفعى الماء يوضح جميع طبقات السقف البصري عدا الطبقة
الأخيرة . ملون أزرق المثلين ، X 100 .

pm الأم الحنون ، sac الطبقة الألبومية المركزية ،
sfgsa الطبقة الليفية السنجابية السطحية الثانوية a ،
sfgsb الطبقة الليفية السنجابية السطحية الثانوية b ،

وهذا ما أشار إليه [26] عند دراسته في العضاءه خلال دراستهم على الأفاعي . ولوحظ أيضا إن سمك الطبقة (SO) قد بلغ 30-40 μm وهي قريبة جدا من سمك الطبقة ذاتها في أفعى *Thamnophis sirtalis* والتي بلغت 35-45 μm [19]، إما سمك هذه الطبقة في الأفعى السامة فقد بلغ 60 μm [25]. تمتلك هذه الطبقة حزما من المحاور تكون مرزومة بشكل شديد وتتفصل عن بعضها بمناطق مكونة من فسا Gaps كما توجد حزيما خفيفة منتشرة من خلال جسر من خلايا اللبد العصبي Nouropil ويتواجد ضمن هذه الطبقة خلايا عصبية مغزلية وخلايا دبقية صغيرة [25].

وذكر [27] إن هذه الطبقة (SO) في الطائر الياباني Japanese quail تشكل أولى طبقات السقف البصري وتمتلك عددا قليلا من خلايا عصبية . إما [28]، [29] فقد بينوا إن الطبقة (SO) تشكل معظم الطبقة السطحية لسقف الدجاج وتكون المسلك البصري Optic tract لا متلاهما والألياف المغمدة Myelinated fibers. تمثل الطبقة الليفية السنجابية السطحية (SFGS) الطبقة الرئيسية الثالثة لسقف دماغ أفعى الماء العراقية وهي تتكون من ثلاث طبقات ثانوية هي a, b, c، وقد أشار إلى ذلك أيضا [18]، [30]. وبلغ سمك هذه الطبقة (SFGS) في أفعى الماء 150-180 μm ، فيما أشار [25] إلى إن سمكها كان 350-420 μm في الأفعى السامة في حين أوضح [19] إلى إن سمك هذه الطبقة كان 80-200 μm في أفعى *Thamnophis sirtalis* وتعد هذه الطبقة من اسمك طبقات السقف البصري في أفعى الماء . كما لوحظ إن سمك الطبقة الثانوية a مساوي لسمك الطبقة الثانوية b وهو 20-30 μm وقد أشار [19] إلى قياسات الطبقات الثانوية في أفعى *Thamnophis sirtalis* وقد بلغت 60-70 μm للطبقتين a, c و 30-50 μm للطبقة b. وذكر كل من [29]، [31] إن هذه الطبقة (SFGS) في الطيور تتكون من عشر صفائح خمسة منها خلوية والخمسة الأخرى تكون ظفيرية. تكون خلاياها ما بين كروية وكمثرية الشكل وتمتلك تغصنات تتفرع تفرعات ثانوية كما يظهر في بعض أجسادها تجمعات لحبيبات نسل Nissl granules، كما يمكن تمييز الطبقة الثانوية b عن طريق حزمة من الخلايا الضيقة مرتبة بشكل صف واحد في المركز وهذا يتفق مع [19]. واعتبر [32] الطبقتين (SO) و (SFGS) طبقات مستقبل الشبكية في السقف البصري للعضاءه الحمام Ctenophorus. في حين أشار [33] إلى إن الجزء العلوي من هذه الطبقة يعد طبقة مستقبل الشبكية في الحمام. إما في اللبائن فقد ذكر [13] إن الطبقات الثلاث السطحية



شكل (8) مقطع مستعرض مار خلال الطبقتين الأساسية والأخيرة للسقف البصري لدماغ أفعى الماء . ملون أزرق مثلين 400 X.

كبيره، نوى الخلية متعددة الأقطاب الكبيرة، ep بطانة عصبية، lmn خلايا عصبية متعددة الأقطاب البطين البصري، sap الطبقة الاليومية حول ألبطينيه، sgn الطبقة السنجابية حول ألبطينيه، smn خلية عصبية صغيرة

المناقشة :

وجد أن السقف البصري لدماغ أفعى الماء العراقية يتكون من سبع طبقات رئيسية. وان الطبقة الرئيسية الثالثة وهي الطبقة الليفية السنجابية السطحية (SFGS) تمتلك ثلاث طبقات ثانوية هي a, b, c) وهذا يتفق مع ما أشار إليه [17] من خلال دراسته لأفعى الماء *Natrix sipedon*، ومع [18]، [19]، [20]، [21] في الأفعى الأمريكية الشرقية السامة *Thamnophis sirtalis*. في [22] لقد ذكر أن مكونات السقف البصري في الزواحف تختلف باختلاف أنواعها، ففي العضاءه *Lscerta sicula* والسلمحفاة *Chelydra serpentina* يتكون من ثلاث طبقات رئيسية مقسمة إلى أربعة عشر طبقة ثانوية، وفي أفعى الماء *Natrix natrix* فإنه يتكون من ثلاث طبقات رئيسية مقسمة إلى ثلاث عشر طبقة ثانوية، وأشار [23] إلى إن مجموع طبقات السقف البصري للعضاءه *Gecko gecko* هي أربعة عشر طبقة رئيسية وثانوية. أما [24] فقد أوضح إن طبقات السقف البصري في السلمحفاة *Pseudemy scripta* هي خمس طبقات رئيسية فقط. أظهرت النتيجة الحالية إن الطبقة الرئيسية الأولى لسقف الدماغ المتوسط في أفعى الماء العراقية هي الطبقة النطاقيية (SZ) والتي تكون ضيقة وظفيرية الشكل يبلغ سمكها 20-25 μm ، في حين كان سمكها 25-30 μm في الأفعى السامة Viper وأفعى *Thamnophis sirtalis* على التوالي [19]،

[25]. وتمتلك هذه الطبقة عددا قليلا من خلايا عصبية كروية صغيرة الحجم. إما الطبقة الرئيسية الثانية الطبقة البصرية (SO) وتسمى أيضا بطبقة مسلك الألياف البصري أفعى *Thamnophis*

Afferents fibers للسقف . كما وأشار [31] من خلال دراسته في السقف البصري لطائر السلوى إن هذه الطبقة تمثل الطبقة الرئيسية الرابعة في السقف البصري لهذا الطائر وتشكل الطبقة الرئيسية للألياف الصادرة Efferents fibers حيث تكون بشكل حزم تحيط بالبطين البصري Optic ventricular في الجزء الخلفي من الفص البصري .

تمثل الطبقة السنجابية حول البطينية (SGP) الطبقة الرئيسية السادسة من طبقات السقف البصري في دماغ أفعى الماء العراقية وتشكل طبقة غير عريضة يبلغ سمكها 60-70 μm وقد أشار [19] إلى إن سمك هذه الطبقة في الأفعى الأمريكية *Thamnophis sirtalis* كان بحدود 50-60 μm . وهي تمثل المسلك الرئيس للألياف الصادرة Efferent fibers وهذا يتفق مع [18] . تتميز هذه الطبقة بامتلاكها خلايا متعددة الأقطاب كبيرة بلغ قطرها 15-30 μm . كما تكون نواها كبيرة وهذا يتفق مع ما جاء به [24] . كما أوضح [20] في أفعى *Thamnophis sirtalis* أن الفروع المحورية والتغصنية لخلايا هذه الطبقة (SGP) تحتل مساحة العليا وتحمل تغصناتها لواحق دقيقة تنشأ منها تفرعات تنتشر عرضياً في حقل تغصنات الخلية . إما [31] فبين إن هذه الطبقة (SGP) في طائر السلوى تمتلك خلايا نجمية الشكل غير منتظمة الترتيب وتصل تغصناتها إلى الطبقة الرئيسية الرابعة (SAC) في الأعلى ، والطبقة الرئيسية السادسة (SFP) في الأسفل.

إما الطبقة الرئيسية الأخيرة للسقف البصري في دماغ أفعى الماء العراقية فهي الطبقة الألبومية حول البطينية (SAP) وقد بلغ سمكها 40-50 μm ، إما سمكها في أفعى *Thamnophis sirtalis* فهو 40-30 μm . تقع هذه الطبقة فوق طبقة البطانة العصبية Ependymal التي تحيط بالبطين البصري. تكون طبقة البطانة العصبية في السقف البصري لدماغ أفعى الماء واضحة ومتميزة حيث تتكون من صفين إلى ثلاثة صفوف من الخلايا الكثرية والكروية الصغيرة. في حين أشار [22] إلى إن خلايا البطانة العصبية تكون الطبقة الأولى في السقف البصري لأفعى الماء *Natrix natrix* . وبين [29] إن الطبقة الليفية حول البطينية (SFP) والتي تمثل الطبقة الأخيرة من طبقات السقف البصري في الدجاج تقع اعلى البطانة العصبية وتمتلك هذه الطبقة تغصنات الخلايا العصبية الواقعة في (SGP) . وأوضح [38] انه عند تعليم الألياف في السقف البصري يلاحظ إن الألياف المعلمة تنمركز في عمق السقف إي في الطبقات حول البطينية .

هي الطبقات التي تستلم البروزات من الشبكية . كما وأشار [34] إلى إن الطبقة الرئيسية الثانية للاكيماط العليا للمقدمات الطبقة السنجابية السطحية (SGS) والمكونة من ثلاث صفائح ثانوية a,b,c هي الموقع الوحيد لايعازات الشبكية المباشرة.

إما الطبقة الرئيسية الرابعة في السقف البصري لأفعى الماء العراقية فهي الطبقة السنجابية المركزية (SGC) . يبلغ سمكها في أفعى الماء -130 μm 100 ، وقد أشار [19] إلى إن سمكها في أفعى *Thamnophis sirtalis* كان 100-150 μm ، تسمى أيضاً بالطبقة الرمادية المركزية Gray center layer إذ تعد منطقة خلوية لكثرة الخلايا فيها إذ تمتلك ثلاثة أنواع من الخلايا العصبية المتباينة في الشكل والحجم هي A, B, C . تكون خلايا A متوسطة الحجم كثرية الشكل وكثيرة العدد في المنطقة الحافية لهذه الطبقة ، وتكون خلايا B متوسطة الحجم أيضاً ولكنها مغزلية الشكل تنتشر بصورة مبعثرة على امتداد هذه الطبقة ، في حين تكون خلايا C متوسطة الحجم متعددة الأقطاب توجد في الثلث السفلي من هذه الطبقة وهذا يتفق مع ما به [17] ، [19] . كما وذكر كل من [28] ، [29] إن هذه الطبقة (SGC) تمثل الطبقة الرئيسية الثالثة في السقف البصري للدجاج وتعد طبقة خلوية لامتلاكها خلايا متعددة الأقطاب كبيرة الحجم. إما في السقف البصري للطائر الياباني Japanese quail فإن هذه الطبقة (SGC) تمتلك تجمعات متماثلة لعدد من الخلايا النجمية Stellate cells تمتد من أجسادها تغصنات كبيرة [35] . وأوضح [36] من دراسته في العضاء *Iguana iguana* إن الطبقات الثلاث (SO) ، (SFGS) ، (SGC) تمثل طبقات مستقبل الشبكية . في حين ذكر [37] أن الوحدات البصرية توجد في الطبقات [السابعة – الثالثة عشر] للسقف البصري في الأفعى ذات الأجراس.

إما الطبقة الرئيسية الخامسة في السقف البصري لأفعى الماء فهي الطبقة الألبومية المركزية (SAC) وتسمى أيضاً بالطبقة البيضاء المركزية white central layer سمكها هو 80-100 μm وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع [19] في أفعى *Thamnophis sirtalis* إذ كانت 100-150 μm . وأشار [26] إلى إن هذه الطبقة (SAC) تمثل الطبقة السادسة في السقف البصري للعضاء *Dipsosaurus dorsalis* . ولوحظ إن هذه الطبقة تحتوي على حزم من ألياف ذات أقطار دقيقة وكبيرة تمتد بصورة متوازية مع سطح السقف البصري و هذا يتفق مع ما أشار إليه [17] في أفعى *Natrix sipedon* . وذكر [29] إن هذه الطبقة (SAC) تشكل الطبقة الرئيسية الرابعة في السقف البصري للدجاج وتعد طبقة ظفيرية layer plexiform تحتوي على ألياف واردة

- McMacmillan Co., New York : 880 pp.
- 10- Yamagata, M. and Sanes, J. R. 1995. Lamina_ specific cuse guide outgrowth and arborization of retinal axon in the optic tectum. *Development*, 121 : 189-200.
- 11- Hyde, P. S. and Knudsen, E. I. 2002. The optic tectum controls visually guided adaptive plasticity in the owls auditory space map. *Nature*, 415 : 73-76.
- 12- Gaillard, F. 2001. Nucleus isthmi, a satellite visual center of the optic tectum in amphibians: anatomy physiology and behavioral function. *Comp. Biochem. Physiol.*, 8: 43-78.
- 13- Hartling, J. K. ; Hall, W. C. ; Diamond, I. T. and Martin, G. F. 1973. Anterograde degeneration study of the superior colliculus in *Tupaia gil* : Evidence for a subdivision between superficial and deep layers. *J. Comp. Neur.*, 148 : 361-386.
- 14- Luna, L. G. 1968. Manual of histological staining methods of the forces institute of Pathology, 3rd edn. Mc-Grawhill book, New York : 258 pp.
- 15- Rodger, J.; Bartlett, C. A.; Beazley, L. D. and Sarah, A. D, 2000. Transient up-regulation of the rostro caudal gradient of ephrin A2 in the tectum coincides with reestablishment of orderly projection during optic nerve regeneration in goldfish .*Exp. Neur.*, 166 :196-200.
- 16- Bancroft, J. D. and Stevens, A. 1982. Theory and practice of histology techniques. 2nd Churchill. Livingston, London. 662 pp.
- 17- Ulinski, P. S. 1977. Tectal efferents in the Banded water snake, *Natrix sipedon* .*J. Comp. Neur.*, 173 : 251-274.
- المصادر:**
- 1- Khalf, K. T. 1959. Reptiles of Iraq with some notes on the amphibians *Ar_ Rabitta* press, Baghdad : 73 pp.
- 2- Murray, M. ; S. and Edwards, M. A. 1982. Target regulation of synaptic number in the compressed retinotectal projection of Goldfish. *J. Comp. Neur.*, 209: 374-385.
- 3- Yamamoto, N.; Yoshimoto, M.; ALBERT, J. S. Sawai, N. and Ito, H. 1999. Tectal fiber connection in a non-teleost Actinopterygian fish ,the *Sturgeon acipenser*. *Brain Behav. Evol.*, 53 : 142-155.
- 4- Sligar, C. M. and Voneida, T. J. 1976. Tectal efferent in the Blind cave fish *Astyanax hubbsi*. *J. Comp. Neur.*, 165: 107-124.
- 5- Lazar, G. ; Toth, P.; Csank, G. and Kicliter, E. [1983]. Morphology and location of tactual projection Neurons in frogs : A study with HRP and cobalt _ filling *J. Comp. Neur.* 215: 108-120.
- 6- Nakagawa, H. and Matsumoto, N. 2000. Current density analysis of on / off synaptic number in the frog optic tectum progress in *Neurobiol.*, 16 : 1- 44 .
- 7- Nakagawa, H. and Matsumoto, N. [2000]. Current density analysis of on / off channels in the frog optic tectum progress in *Neurobiol.*, 16 : 1- 44.
- 8- Luksch, H.; Karten, H. J. ; Kleinfeld, D. and Wessel, R. 2001. Chattering and differential signal processing in identified motionsensitive neurons of parallel visual pathways in the chick tectum. *J. Neurosci.*, 21 [16] : 6440-6446.
- 9- Romanoff, A. 1960. The avian embryo structural and functional development .

- cell projection to optic Tectum of *Dipsosaurus dorsalis* [iguanae]. J. Comp. Neur., 196 :225-252.
- 27- Hilbig, H. ; Roth, G. ; Brylla, E. and Robine, K. P. 2000. Cytoarchitecture of the tectum Opticum in the Japanese quail. Neuroscience, 86 [2] :663-678.
- 28- Lavail, J. H. and Cowan, W. M. 1971. The development of the chick optic tectum. I. Normal morphology and cytoarchitectonic development. Brain. Res., 28: 391-419.
- 29- Mey, J. and Thanos, S. 2000. Development of the visual system of the chick I. cell differentiation and histogenesis. Brain Res. Rev., 32 : 343-379.
- 30- Dacey, D. M. and Ulinski, P. S. 1983. Nucleus rotundus in snake, *Thamnophis sirtalis* : An analysis of a nonretinotopic projection. J. Comp. Neur., 216 :175-191.
- 31- الكنانى، احمد سلمان عبد الحسن 2002 . دراسة تكوينية للسقف البصري Optic Tectum في طائر السلوى *Coturnix Japonica* . رسالة ماجستير ، كلية التربية [ابن الهيثم] ، جامعة بغداد :75 ص .
- 32- Rodger, J. ; Bartlett, C. A. ; Harman, A. M. ; Thomas, C. ; Beazley, L. D. and Dunlop, S. A. 2001. Evidence that regeneration optic axon maintain long- term growth in the lizard *Ctenophorus ornatus* : growth – Associated protein- 43 and gefiltin expression. Neurosci., 102 : 647 -654.
- 33-Hayes, B. P. and Webster, K. E. 1976. An electron microscope study of the retinoreceptive Layers of the pigeon optic tectum . J. Comp. Neur., 162: 447-466.
- 34- Tigges, M. and Tigges, J. 1970. The reinofugal fibers and their terminal nuclei in *Galago cassicaudatus* [Primates]. J. Comp. Neur., 138:87-102.
- 18- Dacey, D. M. and Ulinski, P. S. 1986a. Optic tectum of the Eastern garter snake, *Thamnophis sirtalis*. I. efferent pathways. J. Comp. Neur., 245: 1-28.
- 19- Dacey, D. M. and Ulinski, P. S. 1986b. Optic tectum of the Eastern garter snake, *Thamnophis sirtalis*. II. morphology of efferent cells. J. Comp. Neur., 245: 198-237.
- 20- Dacey, D. M. and Ulinski, P. S. 1986c. Optic tectum of the Eastern garter snake, *Thamnophis sirtalis*. III. morphology of intrinsic neurons. J. Comp. Neur., 245:283-300.
- 21- Dacey, D. M. and Ulinski, P. S. 1986e. Optic tectum of the Eastern garter snake, *Thamnophis sirtalis*. V. morphology of brainstem afferents and general discussion. J. Comp. Neur., 245:423-453.
- 22- Senn, D. G.[1979]. Embryonic development of the central nervous system. In : Gans, C.[Ed.]. biology of the reptilian. Academic press Inc. London and New York: 1- 443.
- 23- Butler, A. B. 1978. Organization of ascending tectal projection in the lizard *Gekko gekko*: A new pattern of tectorotundal inputs. Brain Res., 147 :353- 361.
- 24-Sereno, M. I. .1985. Tectoreticular pathways in the turtle, *Pseudemys scripta*. I. morphology of tectoreticular cell. J. Comp. Neur., 233 : 91-114.
- 25- Reperant, J. ; Peyrichoux, J. and Rio, J. P. 1981a. Fine structure of the superficial layers of The Viper optic tectum . A Golgi and electron- microscopic study. J. Comp. Neur., 199 : 393- 417.
- 26- Peterson, E. H. 1981. Regional specialization in retinal ganglion

- modalities in the optic tectum : infrared and visual integration in Rattlesnakes . Science, 199:1225-1229.
- 38- Moga, M.M.; Geib, B. M. ; Zhou, D. and Prins, G. S. 2000. Androgen receptor-Immunoreactivity in the forebrain of the Eastern fence lizard [*sceloporus undulates*]. Brain Res., 879:174-182.
- 35- Hilbig, H.; Bidmon, H. J.; Zilles, K. and Busecke, K. 1999. Neuronal and glial structures of The superficial Layers of the human superior colliculus. Anat. Embryol., 200:103-115.
- 36- Gaither, N. S. and Steim, B.E. 1979. Reptiles and mammals use similar sensory Organizations in the midbrain Science, 205: 595-598.
- 37- Hartling, P.H.; Kass, L. and Loop, M.S. 1978. Merging of

HISTOLOGICAL STUDY ON OPTIC TECTUM IN IRAQI WATER SNAKE *TESSELATA TESSELATA*

*N.A. Al –BAKRI **

*Azhaar Raheem Hussien **

* College of Education (Ibn Al-Haitham) Baghdad University

Abstract:

The ceiling of the midbrain has a couple of optic lobes which are prominent and used as an optic center that reflex what it receives from eye retina fibers. The histology of optic tectum has been studied in Iraqi water snake natrix tessellata tessellata . It was found that the number of optic tectum were seven main strata organized from the outside to the inside as follows : the stratum zonula (SZ), the stratum opticum (SO), the stratum fibrosum et griseum superficialis (SFGS), the stratum griseum central (SGC), the stratum album central (SAC), the stratum griseum periventricular (SGP), and the stratum album periventricular (SAP). the three last strata consider deep layers on the optic tectum

It was noticed that the thinnest strata was the first (SZ), which is (20-25)µ m, in its thickness, while the thickest strata was the third (SFGS), which is (150-180)µ m. this stratum consist of three substrata (a.b.c). it was found that the optic fibers that come from eye retina enter the optic tectum through the second stratum which is the (SO) . so these fibers go out from optic tectum through the sixth stratum which is the (AGP). the fourth (SGC) contained a concentrated cells of three types which are ,the medium pear shape neuron , medium fusiform neuron , and medium multipolar neuron.