

التأثير المزمّن والطويل للجرع الواطئة من سموم الافلا على الأداء الإنتاجي والفسلجي في فروج اللحم

علي حسين خليل الهلالي*، احمد حسين خطار*، خليل إبراهيم أرحيم*

تاريخ قبول النشر 2008/4/14

الخلاصة

أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الإنتاج الحيواني – وزارة العلوم والتكنولوجيا (الطاقة الذرية العراقية سابقاً) للفترة من 2001/9/3 ولغاية 2002/4/8. استهدفت هذه الدراسة تقييم التأثير المزمّن الطويل والحاد للجرع الواطئة من سموم الافلا على الأداء الإنتاجي (وزن الجسم، معامل التحويل الغذائي، استهلاك العلف، نسبة الهلاكات) والفسلجي (المواصفات الكيماوية لبلازما الدم) وفعالية بعض إنزيمات القلب والكبد والدم (الإنزيمات الناقلة لمجموعة الأمين GOT, GPT) وإنزيمي الفوسفاتيز القاعدي، واللاكتك دي هايدروجيز، الأوزان النسبية للأحشاء الداخلية. استخدم في هذه الدراسة 300 طير من أمهات فروج اللحم فاوبرو على علائق ملوثة بسموم الافلا بتركيز 0.3، 0.6، 0.9، 1.2، 1.5، 1.2 ملغم/كغم علف مقارنة بمجموعة السيطرة، غذيت الطيور على المعاملات الأربعة من عمر يوم واحد إلى عمر التسويق (8 أسابيع). أظهرت نتائج التحليل المايكروبي للكشف عن الفطريات تواجد عدد من الفطريات تصدرها أنواع الجنس *Aspergillus* إذ بلغت نسبة تواجدها 40% تلتها الفطر *Pencillium* 30%، و *Fusarium* 22% و *Rizopus* 8%. سبب تواجد سموم الافلا لفترة طويلة انخفاض وزن الجسم، الزيادة الوزنية، كفاءة التحويل الغذائي مع زيادة سموم الافلا في العليقة وارتفاع نسبة الهلاكات عند زيادة نسبة سموم الافلا في العلف، كما سبب التأثير المزمّن الطويل والحاد لوجود سموم الافلا إلى زيادة معنوية في الأوزان النسبية للأحشاء الداخلية (الكبد، البنكرياس، الطحال، القانصة، جراب فابريشيا، المعدة الغدية) والى انخفاض نسبة حجم الخلايا المرصوصة وتركيز خضاب الدم وعدد كريات الدم الحمراء وزيادة في عدد كريات الدم البيضاء والنسبة بين الخلايا الهيترروفيل إلى الخلايا اللمفاوية (H/L). كما لوحظ من النتائج إلى انخفاض في تركيز البروتين، الألبومين، الكولسترول وفعالية أنزيمات القلب، الكبد (GOT, GPT) وأنزيم الفوسفاتيز القاعدي واللاكتك دي هايدروجينيز وفعالية الأنزيمات البنكرياسية (اللايبيز، الاميليز، التربسين).

المقدمة

لمعرفة التأثيرات المسموح بها والتي هي اقل من 1.5 جزء في المليون على الأداء الإنتاجي والفسلجي لفترة طويلة (يوم واحد وحتى عمر التسويق).

المواد وطرائق العمل

استخلص وتنقية سموم الافلا B1 استخلصت سموم الافلا B1 من مزارع العزلات باتباع طريقة الورشان (1999) وتم التأكد من العزلات بواسطة تقنية الكروماتوغرافي الرقيقة (Thin Layer Chromatography) TLC وحسب الطريقة التي أوضحها العاني (2001). أما مستوى سموم الافلا في العليقة فقد تم تقديره وفقاً للطريقة الموصوفة من قبل Nerbitt and Nabney (1965) والمحورة من فيل Weisman وزملائه (1967). تم اخذ نماذج من العلف قبل التلوين وبعده لتقدير النسب الأصلية لسموم الافلا من خلال استخدام طريقة Taylor and Howell (1981). بعد تقدير سموم الافلا في العلف الذي تم تحفيفه بالعلف النظيف غير الملوث للحصول على النسب التالية 0، 0.3، 0.6، 0.9، 1.2، 1.5، جزء من المليون.

التجربة الحقلية

اجريت هذه الدراسة في حقل الإنتاج الحيواني التابع لمنظمة الطاقة الذرية العراقية حيث استخدم عليقة دجاج لحم جهزت من معمل علف الوردية، وتم خلط جزءاً من العليقة مع الرز المطحون والملوث بسموم الافلا B1 بكمية محسوبة بحيث يكون التركيز النهائي بالنسب

تحتل السموم الفطرية الموقع الأول في أهميتها الدراسية كونها اشد المواد الطبيعية في تأثيراتها السرطانية على الطيور الداجنة كون إن مكونات علائق الدواجن تشكل أفضل الأوساط لإنتاج ونمو هذه السموم (Hessektine, 1976) لقد أثبتت الأبحاث التي أجريت على تأثير هذه السموم على الأداء الإنتاجي والفسلجي لإفراغ اللحم إنها سببت تأخر النمو لأفراخ وضعف التحويل الغذائي بالإضافة إلى زيادة الهلاكات وتدهور نوعية اللحوم للقطعان المتعرضة للجرع الواطئة من سموم الافلا (Lynne وجماعته، 1995)، كما أظهرت عدد من الدراسات التي أجريت في العراق إن سموم الافلا B1 لها تأثيرات واضحة في القيم البيولوجية والأنزيمات الأساسية يرافقها انخفاض في نسبة البروتين والألبومين والكولسترول فضلاً عن انخفاض معنوي في فعالية الأنزيمات: Aspartat Lactic dehydrogenase, amino transferase creative و أنزيم الفوسفاتيز القاعدي (ALKP) و Kinase (Huff وجماعته 1985 و 1992) إضافة إلى التأثيرات السلبية لسموم الافلا على الجهاز المناعي عن طريق إصابة غدة فابريشيا (البورصا) التي تُعد مركزاً لتنضيج وتمايز الخلايا للمفاوية نوع B التي تكون الأجسام المضادة (Hamilton, Chao, Fu, 1982). إن اغلب البحوث التي أجريت سابقاً درست التأثير الحاد لسموم الافلا لفترة قصيرة من الفقس وحتى عمر 3 أسابيع لذا أجريت هذه الدراسة

العلف وكذلك لوحظ ارتفاع نسبة الرطوبة في العلف الملوث نتيجة للعمليات التي أجريت عليه أثناء التلوث.

2- تأثير الجرعة الواطنة من سموم الافلا على أوزان الطيور، معامل التحويل الغذائي ونسبة الهلاكات خلال فترة التجربة (0-8) أسابيع

أوضحت النتائج في جدول (1) اختلافات معنوية في أوزان الطيور بين المعاملات المختلفة منذ الأسبوع الثاني إذ سجلت أوطاً الأوزان في معاملات العلائق الحاوية على 0.9، 1.2، 1.5 جزء في المليون من سموم الافلا ثم بدأ الانخفاض في وزن الجسم للعلائق الأخرى والمحتوية على سموم الافلا (0.3 - 0.9) منذ الأسبوع الرابع وقد يعود سبب انخفاض وزن الجسم عند التغذية على علائق تحتوي على السموم الفطرية إلى اضطراب في التمثيل الغذائي نتيجة لانخفاض فعالية الأنزيمات الهاضمة مثل الأميليز، التربسين اللايباز (العاني 2001) وكذلك للتداخل بين الاجهادات البيئية وسموم الافلا (Al-Hassani وجماعته 1988 Smith وجماعته 1995) وكذلك لوحظ زيادة عددية في نسبة الهلاكات بتقدم عمر الطيور وهذا يعود إلى التأثير التراكمي لهذه السموم على الطيور مما يؤدي إلى فقر الدم الشديد وهجوم الأمراض المصاحبة لوجود السموم الفطرية (الهالي وجماعته 2002). كما نلاحظ من الجدول (1) انخفاض كفاءة التحويل الغذائي الذي قد يعود إلى انخفاض في قدرة الطير على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهن (Kubena وزملائه 1990).

3- المواصفات التركيبية لدم الطيور للمعاملات المختلفة

أوضحت نتائج تحديد مواصفات الدم في المعاملات المختلفة تأثيرات مختلفة على مواصفات الدم فقد وجد أن التراكميز العالية من سموم الافلا B1 أدت إلى انخفاض معنوي ($P < 0.05$) في حجم الخلايا المضغوطة مقارنة بالمعاملات ذات التراكميز المنخفضة (جدول 2) وفي نسبة هيموكلوبين الدم وعدد خلايا الدم الحمراء وهذا يرجع إلى إن سموم الافلا تسبب فقر الدم Anemia نتيجة لانخفاض قابلية الأمعاء على امتصاص الحديد (Lanza وجماعته 1974) في حين كان عدد كريات الدم البيضاء مرتفع معنوياً منذ الأسبوع الرابع في المعاملات المرتفعة التركيز (1.2، 1.5) ويبدأ الارتفاع في المعاملات الأخرى في الأسابيع (6، 8) أسبوع وهذا مؤشر واضح على استحثاث تكوين الكريات البيضاء. وتشير البيانات إلى أن التراكميز المختلفة من سموم الافلا وخصوصاً التراكميز العالية تسبب إجهاد الطيور لكون حصلت زيادة معنوية في نسبة خلايا الهيتروكيل إلى الخلايا للمفاوية (Shareef وجماعته 1998).

4- الأوزان النسبية للأعضاء الداخلية الرئيسية لطيور المعاملات المختلفة

أشارت النتائج في جدول (3) الأوزان النسبية لكل من الكبد والكلية والطحال والقلب والمعدة الغدية والقانصة وغدة فابريشيا (البورصا) لطيور المعاملات المختلفة تبانياً على نوع المعاملة وعمر الطير إذ وجد أن جميع معاملات الأوزان النسبية لأعضاء طيور المعاملة

المذكورة في العليقة المقدمة للطيور من بداية التجربة وحتى نهايتها نفذت التجربة وفق التصميم العشوائي التام واستخدم فيها 300 فرخ من أفراخ فروج اللحم فاوبرو نوع CD بعمر يوم واحد تم الحصول عليها من مشروع دواجن الأصول - سامراء التابع لمركز أباء للأبحاث الزراعية. وزنت الأفراخ وكان معدل الوزن 42 غم قسمت عشوائياً إلى 6 معاملات بواقع 50 فرخاً للمعاملة الواحدة بمكررين (25 طير لكل مكرر) في اليوم الثاني بدأت التغذية بالعلائق المختلفة منذ الأسبوع الأول. خضعت الأفراخ للبرنامج الوقائي وتم جمع البيانات التي شملت وزن الجسم من عمر يوم واحد وحتى عمر 8 أسابيع حيث وزنت الأفراخ كل أسبوعين، سجلت الهلاكات يوميا لكل أسبوع واستخرجت النسبة المئوية في نهاية كل أسبوعين من عمر الطيور، أخذت ستة طيور عشوائياً من كل معاملة ثم وزنت وذبح كل طير عن طريق الوريدين الوداجيين عند عمر (4، 8) أسابيع واخذ نموذج الدم في أنابيب حاوية على مادة مانعة للتخثر Potassium EDTA وقسمت إلى قسمين الأول استعمل لقياس نسبة الخلايا الهيتروكيل إلى الخلايا اللمفية (H/L) وقيس العدد التقريفي لكريات الدم البيض بأخذ مسحات دموية على شرائح زجاجية وصبغها بصبغتي Wright-gimsa وفق طريقة Shen وPatterson (1983). كما قدرت نسبة الهيموكلوبين وحجم كريات الدم الحمراء. أما القسم الثاني من الدم فقد وضع في جهاز الطرد المركزي سرعة 3000 دورة/دقيقة لمدة 15 دقيقة لفصل البلازما لتقدير تركيز البروتين، حامض البوريك، صبغة البلوروبين. بعد سحب عينات الدم أكمل الذبح بقطع الشريان والمرئ والقنصة الهوائية واستئصال الكبد والطحال والبنكرياس والمعدة الغدية والقانصة والقلب وغدة فابريشيا ووزن كل منها باستعمال ميزان حساس. بعد ذلك تم تقدير الوزن النسبي لكل عضو من هذه المجموعة إلى وزن الجسم وحللت النتائج إحصائياً باستخدام البرنامج الإحصائي الجاهز SAS (1992) ولتحديد معنوية الفروق بين المعاملات تم استخدام اختبار دانكن متعدد المديات (Duncan، 1955).

النتائج والمناقشة

1- مسح الفطريات المرافقة للعليفة

أظهرت نتائج التحليل الميكروبي لنموذجي العلف الملوث بسموم الافلا إلى تواجد أنواع من الفطريات تصدرها أنواع الجنس *Aspergillus* والذي بلغ توأجه في العلائق من 40 - 50% بمعدل (45%) تلتها الأجناس *Pencillium* (34%) *Fusarium* (11%) وأجناس أخرى (3%) وان سيادة أنواع الجنس *Aspergillus* في العلائق قد يعود إلى قابلية هذا الجنس على النمو في أوساط رطوبة مختلفة تتوفر خلال الخزن والتصنيع (Jelinek وجماعته، 1989). كما أظهرت نتائج التحليل الكيميائي لنماذج العلف الملوث وغير الملوث حصول انخفاض في نسبتي البروتين والدهن من (22، 4.35%) إلى (15.0، 3.06%) على التوالي في العلف الملوث ويرجع سبب ذلك إلى مساهمة الفطريات باستهلاك جزء من مكونات

سموم الافلا (جزء بالمليون)						
العمر	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
حجم الخلايا المضغوطة						
الاسبوع الرابع	140.0	138.16	138.0	32.0	28.6	23.4
الاسبوع السادس	133.5	25.0	24.4	24.0	22.2	21.0
الاسبوع الثامن	103.66	28.0	27.0	24.0	25.0	22.0
تركيز الهيموغلوبين (غ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	113.6	113	112.0	8.45	8.36	7.55
الاسبوع السادس	111.7	111.2	114.2	9.0	8.1	7.15
الاسبوع الثامن	119.9	118.5	118.3	8.1	7.2	7.0
كريات الدم الحمراء (10 ¹²)						
الاسبوع الرابع	4.8	4.6	4.2	3.16	2.65	2.15
الاسبوع السادس	4.09	3.96	3.7	3.2	2.40	1.65
الاسبوع الثامن	4.7	4.67	4.5	2.8	2.6	2.3
كريات الدم البيضاء (10 ⁹)						
الاسبوع الرابع	28.8	27.9	27.5	27.9	29.8	34.2
الاسبوع السادس	25.9	27.5	28.6	30.8	32.6	37.2
الاسبوع الثامن	26.2	26.7	26.8	34.2	34.8	38.6
نسبة الهيموغلوبين إلى الصفوية H/L						
الاسبوع الرابع	0.26	0.27	0.27	0.36	0.56	0.64
الاسبوع السادس	0.31	0.49	0.5	0.64	0.75	0.78
الاسبوع الثامن	0.39	0.34	0.4	0.60	0.56	0.58

جدول (2) التأثير المزمّن والطويل للجرع المسموح بها من سموم الافلا على المواصفات التركيبية لدم فروج اللحم عند عمر التسويق. الحروف المتشابهة ضمن الصف الواحد يدل على عدم وجود فروقات معنوية بين المعاملات المختلفة على مستوى احتمال اقل من 0.05 ($P > 0.05$).

سموم الافلا (جزء بالمليون)						
المعاملة	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
الوزن النسبي للأعضاء الداخلية (غ/100 وزن الجسم) 4 اسابيع						
الكبد	12.50	12.56	3.2	3.4	3.6	3.9
الكلى	10.50	10.50	10.55	10.54	10.6	0.80
البنكرياس	10.3	10.35	10.40	10.44	10.48	0.6
الطحال	10.20	10.19	10.18	10.18	10.26	0.30
القلب	10.64	10.62	10.61	10.65	10.65	10.60
البروصا	10.32	10.30	10.30	10.28	10.27	10.28
القنصة	13.8	13.9	13.65	4.2	5.0	5.20
المعدة الغدية	10.60	10.62	10.65	10.7	0.9	1.2
الوزن النسبي للأعضاء الداخلية (غ/100 وزن الجسم) 8 اسابيع						
الكبد	12.08	12.14	12.20	2.5	2.7	2.9
الكلى	10.48	10.59	10.54	10.70	0.83	0.93
البنكرياس	10.55	10.55	10.58	10.65	0.73	0.81
الطحال	10.22	10.23	10.23	10.24	10.28	0.32
القلب	10.65	10.70	10.78	10.88	1.04	1.03
البروصا	10.35	10.35	10.36	10.34	10.33	10.31
القنصة	13.6	13.6	13.58	3.63	4.06	5.0
المعدة الغدية	10.7	10.67	10.74	10.64	1.15	1.45

جدول (3) التأثير الطويل والمزمّن للجرع الواطنة من تركيز سموم الافلا على الأوزان النسبية للأعضاء الداخلية عند عمر 4 و8 اسبوع. الحروف المتشابهة ضمن الصف الواحد يدل على عدم وجود فروقات معنوية بين المعاملات المختلفة على مستوى احتمال اقل من 0.05 ($P > 0.05$).

سموم الافلا (جزء بالمليون)						
العمر	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
كوليسترول (مليغ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	147	121	111	105	117	107
الاسبوع الثامن	134	130	130	135	153	1650
بروتين البلازما (غ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	2.80	2.60	2.30	1.96	1.48	1.40
الاسبوع الثامن	3.75	3.60	3.51	2.70	2.26	2.17
سكر الدم (مليغ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	313	325	324	326	367	263
الاسبوع الثامن	245.4	250.4	260.3	262	250	248
حمض اليوريك (U.A) (مليغ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	3.45	3.32	3.22	4.09	4.56	4.95
الاسبوع الثامن	3.6	3.41	3.44	4.16	4.22	4.45
صبغة البيلروبين (T.S.B) (مليغ/100 مل)						
الاسبوع الرابع	0.25	0.24	0.22	0.30	0.32	0.35
الاسبوع الثامن	0.32	0.32	0.48	0.65	0.70	0.64

جدول (4) التأثير المزمّن والطويل للجرع المسموح بها من سموم الافلا على المواصفات الكيميائية لبلازما دم فروج اللحم (عمر 4 و8 اسابيع) الحروف المتشابهة ضمن الصف الواحد يدل على عدم وجود فروقات معنوية بين المعاملات المختلفة على مستوى احتمال اقل من 0.05 ($P > 0.05$).

بالافلاتوكسين B1 باستثناء القلب وغدة فابريشيا قد زادت معنويا عند عمر 4 اسابيع مع زيادة نسبة سموم الافلا في العلف كما وجد أن الكبد يميل إلى اللون الأصفر مع زيادة سموم الافلا ويمكن تفسير ذلك إلى ترسب كمية كبيرة من الدهن على الكبد وإعطاء اللون الأصفر والقوام الدهني (Calnek وجماعته 1991) كذلك لوحظ زيادة الوزن النسبي للأعضاء الأخرى كالكلبتين والطحال والقنصة والمعدة الغدية في طيور المعاملة عند عمر 8 اسابيع إذ زاد وزن الكبد بنسبة 139%، الكليتين بنسبة 194% والبنكرياس بنسبة 147% والقلب بنسبة 158% والقنصة بنسبة 139% والمعدة الغدية بنسبة 207% والطحال بنسبة 145% مقارنة بمعاملة السيطرة كما رافق المعاملات ذات التراكيز العالية وجود بقع نزفية في الكلية عند عمر 4 و8 اسابيع.

5- المواصفات الكيميائية لبلازما دم الطيور للمعاملات المختلفة

أوضحت نتائج التحليل الكيميائي لبعض مكونات بلازما الدم في طيور المعاملات جدول (4) اختلافات متفاوتة إذ وجد انخفاض معنوي ($P < 0.05$) في تركيز البروتين في دم الطيور المعاملة بسموم الافلا B1 مقارنة بتركيز البروتين في دم طيور السيطرة وهذا التأثير امتد إلى نهاية التجربة ويفسر تأثير ذلك إلى الإجهاد الذي يسببه تواجد سموم الافلا فيهدم البروتين وتكوين السكر من مصادر غير كربوهيدراتية (Huff وجماعته 1986) وكذلك يلاحظ زيادة حامض البوريك في دم الطيور المعاملة بالافلاتوكسين وهي مرافقة لانخفاض البروتين في الدم، أما صبغة البيلروبين فتتخفف نسبتها نتيجة المعاملة لفترة طويلة وذلك لزيادة تحلل كريات الدم الحمراء التي تستخرج منها صبغة البيلروبين الصفراء وهذه النتيجة تتوافق مع الانخفاض المعنوي لكريات الدم الحمراء ويستدل من النتائج انه لا توجد حدود آمنة لسموم الافلا وإذ إن تأثيراتها المزمّن اخطر على الصحة العامة من تأثيراتها الحادة ولفترة قصيرة.

سموم الافلا (جزء بالمليون)						
العمر	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
وزن الجسم (كغم)						
الاسبوع الثاني	1240	1235	1220	190	150	137
الاسبوع الرابع	1670	1550	1520	475	445	390
الاسبوع السادس	1420	1760	1675	590	551	508
الاسبوع الثامن	1850	1950	1860	720	701	660
نسبة الهالكات %						
الاسبوع الثاني	10.0	10.0	4	6	6	10
الاسبوع الرابع	0.0	10.0	6	4	6	14
الاسبوع السادس	2	3	4	8	4	12
الاسبوع الثامن	2	3	6	8	4	20
التحويل الغذائي						
الاسبوع الثاني	1.62	1.6	1.88	2.4	2.6	3.0
الاسبوع الرابع	1.9	2.4	3.3	3.7	3.8	3.9
الاسبوع السادس	12.54	12.7	12.7	3.62	5.0	5.2
الاسبوع الثامن	12.46	12.7	12.7	3.84	6.19	6.7

جدول (1): التأثير المزمّن والطويل للجرع الواطنة والمسموح بها من سموم الافلا على أوزان الجسم، كفاءة التحويل، نسبة الهالكات من عمر الفقس إلى عمر 8 اسابيع.

الحروف المتشابهة ضمن الصف الواحد يدل على عدم وجود فروقات معنوية بين المعاملات المختلفة على مستوى احتمال اقل من 0.05 ($P > 0.05$).

- المصادر
11. Huff,W.E. 1992. Efficacy ofhydrated sodium calcium aluminosilicate to reduce the individual and cmbined toxicity of aflatoxine and ochratoxin A. Poultry Sci. 71: 64 – 69.
 12. Huff,W.E.,L.F.Kubena,R.B.Harvey,D. E.Cerrier,and H.H.Molen hauer ,1986 .Progression of aflatoxicosis in broiler chickens,poultry Sci.65:1891 –1899.
 13. Kubena,L.F.;R.B.Harvey,W.E.Huffand .E.Phillips,1990.efficacy of Ahydrated sodium calcium alumino- silicate to reduce the toxicity of afla- toxine and T–2 toxine.Poultry Sci.69:1078– 1086.
 14. Lanza,G.M.;K.W.Washburn and R. D.Wyatt,1980.Strain variation in haematological response of broiler to dietary aflatoxine.Poultry Sci.59 :2686–2691.
 15. Lynne,L.C.,H.L.Trenholm,D.B.Pr- elusky and A.Rosenbery,1995 .Eco- nomic Losses and Decontamination Natural. Toxins. 3:199– 203.
 16. Nabney,Jand B.F.Nesbitt ,1965.Asp- ectrophotometric method of dete rmining the aflatoxin.Analyst.90:155-160.
 17. SAS,Institute,1992.SAS/STAT.Guide for pers onal computer.11 thed .SAS Institute Inc.,Cary, Nc.
 18. Saudu,B.S.;H.Singh and B.Singh ,1995.Pathological studies in broiler chicks fed aflatoxine or ochratoxin and inoculated with inclusion body hepatitis virus singly and in concu- rrence.Vet.Res.Commun.19:27– 37.
 19. Shareef, M.A.;K.M.T.Al-Jebori and M.G.Hassan,1998.Effect of activat-ed charcoal in reducing dietary afla- toxininduced stress in broiler chic- ks.Iraq.J.Vet. Sci.11:23- 29.
 20. Shen,P.F. and L. T. Patterson, 1983. Asimplified wright's stain technique for routine avian blood smear stain- ing. Poultry Sci. 62: 923 – 924.
 21. Smith,E.E.;L.F.Kubena,C.E.Braithwa ite. R.B. Harvey,T.D. Philips and A.H.Reine,1992.Toxicological eval- uation of aflatoxin and cyelopiaznie
 - 1.العاني، ظافر ثابت محمد، 2000. تأثير الافلاتوكسين على الأداء الإنتاجي والفسلجي لفروج اللحم، رسالة ماجستير – كلية الزراعة – جامعة الانبار.
 2. الورشان، سالم حسن صالح، 1999. استعمال بعض الممدصات الكيميائية للحد من تلوث علائق الطيور الداجنة بالافلاتوكسين B1.
 3. الهلالي، علي حسين خليل، هيثم لطفي صادق، وفاء سامي سعيد، عباس حسين، 2002. التأثير الفردي والتضامني لسموم الأفلا B1 و T2 على الأداء الإنتاجي والفسلجي في فروج اللحم. المجلة العراقية للعلوم البيطرية 26 (2): 97-106.
 4. Al-Hassani, D.H., A. A. aldoori, and S. J.Hamodi,1992. Effects of dietary Aflatoxiri B1 and heat stress on some physiological characteristics in egg- laying breeders, dirasat (Pure and applied Sci). 19: 87 – 94.
 5. Calneck,B.W.,H.J.Barnes,W.M.Reida ndH.W.Yoder,1991.Disea- ses of p- oultry. Ninthed .Wold ford publis- hing company Minneapolis,Min- nesota.
 6. Chao–Fu,C.And P.B.Hamilton, 1982 .Increased severity and new sympt- oms of infections bursal disease during aflatoxicosis in broiler chickens.Poultry Sci. 61:1061– 1068.
 7. Dnnan,D.B.,1955.Multiple range and multiple f.test.Biometrics 11:1-42.
 8. Helinek,C.F.;A.E.Rohland and G.X .Wood,1989.World wide occurrence of mycotoxins in foods and feeds.Aun- pdata,J.Assoc.off Anal.Che.72:223–30.
 9. Hesseltine,C.W.,1976.Condition,leadin g to mycotoxine contamination of food and feeds.In mycotoxins and other fungal related food problems ,(Ed.J.V.Rodrixks).Advances in che- mistry ceres No.149.American Che- mical Society,Washington, D.C., I.
 10. Howell,M.V. and P. W.Taylor, 1981. Determinaiton of aflato xins,ochrat- oxine A.and zearalenon in mixed feed,with detection by thin layer chr- omatography or high performance li- quid chromatography.J.Assoc of An- al. Chem. 63: 1356 – 1363.

of pigments from chlor- oform extract
of aflatoxin cultures with copper car-
bonate. J. Assoc. Agric. Chem. 50:982-983.

acid in broiler chickens. Poultry Sci.
71: 1136 – 1144.

22. Wiseman, H.G.; W.C. Tacabson, and W
.E. Harmeyer, 1967. Note on removal

Effect of Low Level Acute of Aflatoxin on Performance in Faw- Bro Broiler

*A. H. K. Al-Hillali**; *A. Hussien**, and *K. Irhaim.I**

*Ministry of Science and Technology, Agriculture Research Centelr /Baghdad /Iraq

Abstract

This study was conducted in the Poultry farm of the animal during the Production department, Iraqi during the (Ministry of Science and Technology) period from 3-9-2001 to 8-4-2002. The objectives of this study were to evaluate the effect of low – level chronic aflatoxicosis on performance (body weight, feed conversion efficiency and mortality), Serum biochemistry and activity of some enzymes (GOT, GPT, ALKP, LDH).

A total of 300 male chicks of broiler breeder (Faw–Bro) were used. Chicks at day 1 of age were fed diets contaminated with aflatoxine at levels of 0, 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, and 1.5 the feeding period were extended to 8 weeks. The data were subjected to analysis of variance by the completely randomized design. The results showed the presence of a number of fungi especially the type of *Aspergillus flavus* genus that reaches 40%. All aflatoxine dose levels significantly ($P < 0.05$) decreased live weight, it was also noticed that there were higher significant decrease in feed conversion when aflatoxine level was elevated in the feed. Increasing mortality with each increasing in aflatoxine level, the low level of chronic aflatoxine in the diets caused increased in the relative weight of internal organs (Liver, Pancreases, spleen, heart, gizzard, fibresia gland) as a results of aflatoxine presence in the diet, the low level of chronic aflatoxicosis for long time decreased in packed cell volume percentage, heamoglobin concentration and red blood cell cont., with increase in white blood cells and (neutrophil, Hetrophil, Lymphocyte). The aflatoxine increased the serum concentration of protein, albumin, Cholesterol, Phosphor the activity of LDH, GOT, GPT, AIKP.