

التأثير الوراثي الخلوي للمستخلص المائي الخام لأوراق  
نبات العوسج *Lycium barbarum* على خلايا القمم النامية  
لجذور البصل *Allium cepa* L.

علي حسين ادحيه\*\*

سمارة يعقوب\*

بتول علي شهاب\*

تاريخ قبول النشر 2008/3/5

## الخلاصة

اجريت هذه الدراسة للكشف عن التأثيرات الوراثية الخلوية للمستخلص المائي الخام لأوراق نبات العوسج *Lycium barbarum* احد نباتات الفلورا العراقية على خلايا القمم النامية لجذور البصل باستخدام ثلاث تراكيز (50,25,12.5) ملغم/مل ولثلاث فترات معاملة (6,4,2) ساعة وبالاتماد على بعض معايير التحليلات الوراثية الخلوية وهي دليل الانقسام ودليل الطور والزيغ الكروموسومي ولوحظ بأن المعاملة بالتركيز 50 ملغم/مل ولمدة 6 ساعات ادت الى خفض معدل دليل الانقسام الى دون 50% مما يدل على تأثيره السمي والشبه مميت وكذلك اظهر المستخلص قابلية تطهيرية حيث ظهرت حالات مختلفة من الزيغ الكروموسومي.

## المقدمة:

المستخلصة من جذورالجنس *podophyllum* 6)

(sp. .

نبات العوسج *Lycium barbarum* احد نباتات الفلورا العراقية المنتشر بشكل واسع في العراق حيث يستخدم مغلي الاوراق كشاي وكذلك في علاج قروح الفم والحكة وامراض اللثة و الاسهال وتخفيف الالام الحيض (7). وجد ان الكلاكوسيدات المستخلصة من ثمار نبات العوسج ثبتت نمو احد الخطوط الخلوية لمرض ابيضاض الدم في الانسان وكذلك وجد انها تحت الخلايا على الموت المبرمج apoptosis وتزيد من سيولة الاعشوية (8) كما ان هذه الكلاكوسيدات ثبتت تكاثر خلايا ورم الكبد للانسان من خلال ايقاف الدوره الخلوية في الطور S(9) اما تأثير هذه الكلاكوسيدات على الجهاز المناعي لوحظ انها ادت الى زيادة في الفعالية البلعمية لخلايا البلعم

أستعملت النباتات كدواء لآلاف السنين

(1) اصدرت منظمة الصحة العالمية WHO دراسة اوضحت ان حوالي 80% من سكان العالم ما زالوا يستعملون الطب الشعبي في العلاج (2).

أنصب اهتمام العلماء في التركيز على النباتات الطبية التي ممكن ان تستخدم كعلاج للأمراض (3) حيث وجد ان العديد من هذه النباتات تحتوي على الكثير من مركبات الايض الثانوي secondary

metabolic compounds التي ممكن ان تستخدم ضد الاورام antitumor (4)

agents او كعلاج ضد الاورام السرطانية اذ استخلصت مواد مثبطة لتكاثر الخلايا السرطانية مثل القلويدات كقلويد الكولجسين colchicine

المجربون من نباتية *colchicum autumnale* (5) \*والله اعلم بالبيولوجية للمناطق الحارة podophyllum

## المواد وطرق العمل:

حضرت المستخلصات المائية لاوراق نبات العوسج وبتراكيز (12.5, 25, 50) ملغم/مل (15) زرعت الالبصال بعد تنظيفها جيداً في قناني مناسبة حاوية على ماء الحنفية وبعد نمو الجذور الى طول 1-0.5 سم نقلت الى قناني اخرى حاوية على المستخلص المائي وتركت لفترات معاملة مختلفة (2-4-6) ساعة وبعدها قطعت الجذور وحفظت في مثبت محلول كاروني (3 احجام كحول ايثيلي : 1 حجم حامض الخليك الثلجي) المحضر ائياً لمدة 24 ساعة نقلت بعدها الى قناني حاوية على 70% كحول ايثيلي لحين الفحص . حضرت شرائح زجاجية بأستعمال صبغة اسيتوكارمين وفحصت 1000 خلية لكل مكرر اي 3000 لكل تركيز ولكل فترة معاملة.

استخرج المعدل العام لكل تركيز فضلاً عن جذور السيطرة (ماء فقط) وحسب دليل الطور ودليل الحالات الشاذة وفقاً لماورد (16) وحسب المعادلات التالية.

دليل الانقسام=(عدد الخلايا المنقسمة ÷ العدد الكلي للخلايا)  $100 \times$   
 دليل الطور=(عدد الخلايا الطور ÷ عدد الخلايا المنقسمة)  $100 \times$   
 دليل الحالات الشاذة=(عدد الخلايا الشاذة للطور ÷ العدد الكلي للخلايا في الطور نفسه)  $100 \times$   
 حلت نتائج البيانات احصائياً بأستخدام اختبار دنكن (17).

## النتائج والمناقشة :

معدل دليل الانقسام ودليل الطور ونسبة الحالات الشاذة موضح في الجدول (1) حيث وجد ان معدل دليل الانقسام في جذور البصل المعاملة بالمستخلص المائي لاوراق العوسج في التركيزين 12.5mg/ml و 25mg/ml لم يختلفا معنوياً عن جذور السيطرة لفترات المعاملة الثلاثة، اما

الكبير Macrophage phagocytosis والى زياد تكاثر الخلايا اللمفية للطحال وزيادة القابلية على انتاج الاضداد(10).

أما على المستوى الفسيولوجي فقد اظهرت الكلاكوسيدات لثمار هذا النبات القدرة على زيادة فعالية الانزيمات المضادة للأكسدة antioxidant enzymes خصوصاً الانزيمين catalase, superoxide dismutase وبالتالي فأنها تمتلك القدرة على حماية الخلايا والانسجة الجسمية من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة Free radicals (11) وانها تؤدي ايضاً الى تقليل محتوى الكوليسترول الكلي في المصل والترايكليسرويدات Total cholesterol Triglyceride (12) أما (13) وجدوا ان هذه السكريات قد قللت من تأثير عقار mitomycin C المثبط لنقي العظم حيث وجدوا بأنها فعالة في اعادة العد الطبيعي لكريات الدم الحمر وخضاب الدم للفئران التي سبق وان جرعت بالعقار .

كذلك وجد ان اوراق نبات العوسج تحوي على العديد من المركبات الفعالة مثل alkaloids و Tropein و sesquiterpenes و الاخير من المركبات السامة والذي يستخدم في صناعة مبيدات الادغال (14).

أجريت هذه الدراسة لمعرفة التأثيرات الخلوية الوراثية للمستخلص المائي لاوراق نبات العوسج على القمم النامية لجذور البصل *Allium cepa* L من خلال دراسة عدد من المعايير الوراثية الخلوية وهي دليل الانقسام mitotic index ودليل الطور phase index والزيغ الكروموسومي chromosoma aberration.

الاطوار وربما أيضاً ان زيادة فترة التعرض للمستخلص يؤثر على المادة الكروماتينية مما يؤدي الى تميعها (22,23) وقد اشار ( 24 ) بأن المستخلص المائي لنبات المديد *convolvulus arvensis* الغني بالقلويدات قد ادى الى تميع الكروموسومات.

ان ظهور الكروموسومات المتميعة تعتبر حالة من حالات الزيغ الكروموسومي chromosome aberration حيث وجد ان المستخلصات تؤثر على مادة الدنا DNA وتؤدي الى تكسر اطراف الكروموسومات وفقدان مناطق telomeres مما يساعد على التحامها مع كروموسومات اخرى مماثلة في الضرر وايضاً نتيجة عدم بلمره الدنا DNA depolymerisation وانحلال البروتينات النووية المغلفة للدنا مما يؤدي الى حدوث كسر وتبادل بين الياف الكروماتيدات وبالتالي تكوين اشكال غير منتظمة ومنتكئة ( 25,26,27 ).

ان ظهور حالات تميع الكروموسوم في الطور الاستوائي تجعل عملية انفصال الكروماتيدات الشقيقة غير كاملة في الطور الانفصالي حيث تبقى متصلة بالجسور bridges (23,26) وان ظهور هذه الجسور ادى الى ظهور الانوية الصغيرة والتي هي نتيجة لتكسر الكروموسومات عند الانسحاب حيث تتكون قطع صغيرة عديمة السنتروميير تبقى في وسط الساييتوبلازم او بسبب الكروموسومات المتأخرة في الانسحاب lagging chromosome وذلك لتأثير المستخلص على خيوط المغزل والذي ادى الى تأخر ارتباط هذه الكروموسومات بالخيوط المغزلية او عدم ارتباطها ( 28 ) .

يمكن الأستنتاج من خلال هذه النتائج ان المستخلص المائي لاوراق نبات العوسج له قدرة تطفيرية على القمم النامية لجذور البصل.

الجذور المعاملة بالتركيز 50mg/ml فقد اختلف معدل دليل الانقسام معنوياً عن جذور السيطرة للفترات (4,6 ساعات) حيث ادى الى خفض المعدل العام لدليل الانقسام لتلك الفترات الى اقل من 50% عند حسابه كنسبة مئوية من السيطرة (35.93, 47.43) على التوالي جدول (2) مما يدل على ان لهذا المستخلص تأثير سمي شبه مميت cytotoxic حيث اوضح كل من ( 20, 18, 19) بأن المواد او المستخلصات التي تسبب انخفاضاً في دليل الانقسام بنسبة 50% او اقل هي ذات تأثير سمي شبه مميت حيث اشار (15) بأن معاملة القمم النامية لجذورالبصل بمستخلصات ذات تراكيز مختلفة لكل من الحبة السوداء *Nigella sativa* وساق خناق الدجاج *Euphorbia helioscopia* والسماق *Rhus coriaria* والثوم *Allium sativum* قد خفضت دليل الانقسام الى اقل من 50% في فترة 6 ساعات وقد يعود ذلك لاحتواء هذه المستخلصات على العديد من مركبات الايض الثانوي والتي وجد بان لها القابلية على خفض معدل دليل الانقسام من خلال ايقاف او تثبيط احدى مراحل الدورة الخلوية (21).

الجدول (2) يبين ان المعدل العام لدليل الطور كنسبة مئوية من جذور السيطرة اوضح زيادة في نسبة الطور الاستوائي %153.35 والطورين الانفصالي والنهائي %175.08 وذلك بسبب ظهور الكروموسومات المتميعة خاصة في التركيز 50mg/ml.

شكل (1) يبين الحالات الشاذة نتيجة المعاملة بالمستخلص حيث ان لزوج الكروموسومات وتميعها يدل على تأثير المستخلص المائي لاوراق نبات العوسج على المادة النووية والبروتينات النووية حيث يؤدي الى تجمعها وتكتلها مما يمنع انتقالها الى الطور التالي واحتباسها في هذه






جدول (1) معدل دليل الانقسام ودليل الطور والحالات الشاذة، في خلايا القمم النامية لجذور البصل المعاملة بالمستخلص الخام لأوراق نبات العوسج (*L. barbarum*)

متأخرة	كروموسومات	الحالات الشاذة (%)						دليل الطور (%)			دليل الانقسام (%)	التركيز ملغم/مل	الساعات
		جسور	انفصالي ونهائي متمتع	انفصالي	استوائي متمتع	استوائي متوقف	انفصالي ونهائي	الاستوائي	التمهيدي				
-	-	-	-	-	-	-	-	28.91	16.71	54.36	1.12 ± 6.26	0.00	2
-	-	-	-	-	2.17	-	-	15.12	18.65	66.21	0.92 ± 8.33	12.5	
-	-	-	14.28	-	78.57	-	-	17.23	24.72	58.09	0.96 ± 7.70	25	4
-	-	-	100.00	-	90.32	-	-	35.04	24.44	40.48	0.60 ± 3.90	50	
-	-	-	-	-	-	-	-	13.99	19.52	66.42	0.37 ± 5.06	0.00	6
25.00	-	-	-	-	-	17.85	-	9.55	28.01	61.41	0.53 ± 3.53	12.5	
-	-	-	-	-	-	-	-	20.97	23.55	55.43	0.61 ± 3.66	25	6
-	-	66.66	100.00	-	100.00	-	-	27.64	31.23	41.08	0.72 ± 2.40	50	
-	-	-	-	-	-	-	-	15.88	21.27	62.82	0.65 ± 6.40	0.00	6
-	-	-	-	-	-	2.38	-	16.08	22.95	60.93	0.80 ± 6.13	12.5	
-	-	12.5	93.05	-	65.21	-	-	38.57	22.36	39.04	1.04 ± 4.10	25	6
-	-	20.00	100.00	-	100.00	-	-	32.75	32.72	33.94	0.01 ± 2.30	50	

\* الأحرف المختلفة تمثل فروقاً معنوية (الاحتمالية  $\geq 0.05$ ) بين معدلات العمود الواحد.

جدول (2): النسبة المئوية لدليل الانقسام ودليل الطور لخلايا القمم النامية لجذور البصل المعاملة بالمستخلص الخام لأوراق العوسج *L. barbarum*

التركيز	الساعات	دليل الانقسام (%)	الأطوار (%)	
			الانفصالي والنهائي	الاستوائي
12.5	2	133.06	121.79	111.6
	4	69.76	93.96	143.49
	6	95.78	96.99	107.89
المعدل العام		99.53	104.24	120.99
25	2	123.0	106.86	147.93
	4	72.33	83.45	120.64
	6	64.06	62.14	105.12
المعدل العام		86.46	84.15	124.56
50	2	62.30	74.46	146.25
	4	47.43	61.84	159.98
	6	35.93	54.02	153.83
المعدل العام		48.55	63.44	153.35



شكل (1) خلايا القمم النامية لجذور البصل المعاملة بالمستخلص المائي الخام لنبات العوسج

- 1- طور استوائي متوقف 2- كروموسومات متأخرة في الانسحاب في الطور الانفصالي
  - 3- لزوجه وتميع المادة النووية في الطور الاستوائي 4- جسور وتميع المادة النووية في الطور النهائي
  - 5- تميع ولزوجة في الطور النهائي 6- - تجزء المادة النووية
- قوة التكبير (1000 x)

9. Zhang , J.; Tian , Q. ; Yung , S. ; Zhou, S. ; 2005 . Metabolism and transport of oxazaphosphorines and the clinical implications . *Drug Metabolism Reviews* . 37 : 611 – 703 .
  10. Li , G. ; Yang , J. ; Ren , B. ; & Wang , Z. 2002 . Effects of *Lycium barbarum* L. on mice caused by hypoxia . *Wei – Sheng – Yan – Jiu* , 31 ; 30 – 1.
  11. Zhang , M. ; Wang , J. and Zhang , S. 2002. Study on the composition of *Lycium barbarum* polysaccharides and its effects on the growth of wealing mice . *Wei – Sheng - Yan – Jiu*. 31: 118 – 9.
  12. Luo , Q.; Cai , Y. ; Yan , J.; Sun , M. and Cork , H. 2004. Hypoglycemic and Hypolipidemic effects and antioxidant activity of fruit extracts from *Lycium barbarum* .*Life Sci.* , 26:137 - 49 .
  13. Hai -Yang , G.; Ping , S. ; Li,J.I.;Chang - Hong, X. and fu., T. 2004. Therapeutic effects of *Lycium barbarum* polysaccharide (LBP) on mitomycin C - indaced myelosuppressive mice . *Journal of Exp. Ther . Oncol.* 4:181 - 7 .
  14. Khalid,S.;Ahmed, T. and Shad , R.A. 2002 Use of allelopathy in agriculture .*Asi.J.plant Sci.*1:292 - 297 .
  15. العبيدي ، شيماء صباح مهدي ، 2004، تأثير بعض المستخلصات النباتية الخام على الانقسام الخلوي . رسالة ماجستير . كلية العلوم للبنات . جامعة بغداد.
  16. Becker, W.M. ;Kleinsmith , L.J.;and Hardin, J. 2003 .The World of the cell . 5th edition Benjamin Cummings Publishing Company . Inc. New York
  17. Duncan , D.B. 1955 . Multiple range and multipile F. test. *Biometrics*, 1:1 – 45
- ### Reference
1. Ruffa,M.J.,Ferraro,G.,Wagner,M. L.,Calgano,M.L.,of Campos, R.H., 2002 .Cytotoxic effect of Argentina medicinal plant extracts on human hepatocellular carcinoma cell line . *J.Ethnopharmecal* .70 : 335 – 339 .
  2. Cordell ,G.A. 1995.Changing strategies in natural products chemistry . *Phytochemistry* 40 : 1585 – 1612 .
  3. Aydin,S.,Basaran ,A.A.& Basaran , N. 2004.The protective effects of some phenylethanoid glycosidase on the mitomycin C induced DNA strand break age. Itacettepe University , *Journal of faculty of pharmacy* 24 : 1 – 11 .
  4. Estevez, A.,Marquina ,G. , Polanco , N. ,Contreras,D., 1976 . Antitumor substances from twenty –two Cuban plants . *Revista Cuban de farmacologia* 10: 223 – 227 .
  5. Hastie,S.B., 1991. Interaction of colchicine with tubulin . *Pharmacol . Tner.* , 51: 377 – 401 .
  6. Cragg,G.M.; Newman , D. J. , of weiss , R.B. 1997 .The worldwide exploration of nature for nove anticancer agents . *Oncol* : 24 : 156 – 163 .
  7. الدبعي ، عبد الرحمن سعيد والخليلي ، عبد الولي احمد، 1997، النباتات الطبية والعطرية في اليمن ، انتشارها ، مكوناتها الفعالة ، استخداماتها . مركز عبادي للطباعة والنشر ، صنعاء ، الجمهورية اليمنية .
  8. Gan , L. ; Wang , J.; &Zhang , S. ; 2001. Inhibition the growth of human leukemia cells by *Lycium barbarum* polysaccharide . *Wei – Sheng – Yan – Jiu* , 30 :333 – 5 .

23. Losada, A. & T.Hirano 2001 . Shapinathe metaphase chromosome Coordination of cohesion & Condensation. *Bio Essays* . 23:924 - 935.
24. القيسي ، بيداء عامر (2006). تأثير *Convolvulus arvensis* L مستخلصات المديد في تثبيط الانقسام الخلوي .رسالة ماجستير .كلية العلوم للنبات .جامعة بغداد.
25. Soliman , M.I. 2001. Genotoxicity testing of Neem plant ( *Azadirachta indica* A. Juss.) using the *Allium cepa* chromosome aberration assay .*J.Biol . Sci.* 1:1021 - 1027 .
26. Badr, A.;Ghareeb,A.;El -din , H.A. 1992 .Cytotoxicity of some pesticides in mitotic cells of *Vicia faba* roots . *Egypt.J.Appl.Sci.*7:457 - 468 .
27. Chauhan, L.K.S.; Dikshith, T.S.S.&Sandararaman, V. 1986 . Effect of deltamethrin on plant cell. Cytobiological effects on the root meristems of *Allium cepa* . *Mut. Res.* 171:25 – 30
28. Singh, M.R. 1982.Effect of all with Maleic Hydrazide and Colchicine on root tip mitosis. *Cytologia* . 47:419 - 426.
18. Antonise - Wiez, D. 1990 Analysis of the cell cycle in the root mersitem of *Allium cepa* under the influence of Leda. Krin. *Histochem . Cytobiol.* 26: 76 - 96.
19. Panda , B.B.&Sahu, U.K. 1985. Induction of abnormal spindle function and cytokinesis inhibition in mitotic cells of *Allium cepa* . by the organe phosphorus insecticide Fensul fothion *Cytobios* . 42: 147 - 155 .
20. Sharma, C.B.S.R. , 1983. Plant meristems as monitors of genetic toxicity of environmental chemicals. *Curr. Sci.* 52:1000 – 1002
21. Mihara, M.;Shintani,S. ;Kiyota , A. ; Matsumura, T., and Wong, D.T.W. ; 2002 . Cyclin - Dependent Kinase inhibition suppresses growth and induced Apoptosis by regulating BCL - Xinhead& neck squamous cell carcinoma cells .*Int. Oncol.* 21:95 – 101
22. Yeong , F.M. 2004 . Anaphase , promoting complex in *Caenorhabditis elegans*. *Molecular&Cellular Biology.* 24:2215 - 2225.

## Cytogenetic effect of crude aqueous extract from leaf of *Lycium barbarum* on root tip of *Allium cepa* L.

*Batool A. shahab* \* *Samara N. yaqub* \*\**Ali . H. Adhia* \*

\* Department of Biology – College of Science for Women – University of Baghdad.

\*\* Tropical – Biological Research unit , College of Science , University of Baghdad.

### **Abstract:**

This study was carried out to investigate the cytogenetic effects of crude aqueous extract of *Lycium barbarum* on the roots tip of *Allium cepa* Using three concentration 125, 25, 50 mg/ ml for 2, 4, 6 hours treatment periods. This study were included some cytogenetic analysis such as mitotic index , phase index and chromosome aberration. The data showed that the treatment with 50mg/ml for 6 hours led to reduce the mitotic index less than 50% . This reduction considered to have toxic and sublethal effect . These results revealed mutagenic potency by inducing different types of chromosome aberration.